

心臓ポンプユニット、特殊チップ

使用器具



評価ポイント



心臓内に設置されたポンプユニットを取り替え、特殊チップの除去を行なう術式。ポンプユニットのチップ回収を26ページの術式で処置したら、ガイドラインに沿ってポンプユニットの周囲にメスを入れ、切り離して回収しよう。特殊チップはレーザーを照射すると、一定時間機能が停止する。そのあいだにガイドラインにメスを入れ、特殊チップを切り離せば成功だ。ただし、ガイドラインは5段階あり、右半分、左半分、上半分、下半分、一周の順に表示され、1つずつクリアしていく必要がある。また、途中で特殊チップが再起動した場合は、再度レーザー照射が必要となり、ガイドラインは中断した段階から再開される。なお、再起動回数は評価に影響し、3回以下なら「Cool」、4と5回は「Good」になる。特殊チップを回収したら、追加トレイのポンプユニットを前回と同じ場所に置くと術式完了。このとき設置する角度が、水平に近い角度(±5度)なら「Good」、多少のズレ(±10度)なら「Good」、それ以外なら「Miss」でやり直しになる。

【手順】

- 1 \ メス ポンプユニットを切り離す
- 2 / ピンセット ポンプユニットをトレイへ運ぶ
- 3 / レーザー 特殊チップを焼く
- 4 \ メス 特殊チップを切り離す
- 5 / ピンセット 特殊チップをトレイへ運ぶ
- 6 / ピンセット 新しいポンプユニットをはめ込む



特殊チップを切り離すときは、ガイドラインを気にせず、メスで周囲を何周もなぞるようにしよう。



ポンプユニットや特殊チップを回収トレイに乗せるとき、1度でも下に落とすと評価は下がる。



ポンプユニットの配置場所は心臓内に置けばOK。いちばん重要なのは、水平に置くこと。

評価ポイントに関わる要素

- ・ポンプユニットや特殊チップを落とさずにトレイへ乗せる
- ・特殊チップが再起動する回数を少なくする
- ・新しいポンプユニットの配置角度に注意する
- ・新しいポンプユニットをミスなく配置する

ケイル

使用器具



評価ポイント



素早い動きが特徴のスティグマ。レーザーを一定時間照射すると、「OK」と表示されるので、この手順を繰り返して消滅させよう。ケイルの進む方向を確認しておき、正面からレーザーで押さえつけるように照射すると連続で当てやすい。ちなみに、姿は同じだが、裂傷、腫瘍、大裂傷を生み出すタイプが存在し、腫瘍タイプは同じ場所で回転を行なうと腫瘍を、大裂傷タイプは臓器内に潜ると大裂傷を生み出す。また、2体のケイルが融合する場合があり、融合したケイルは耐久力がアップし、一度に6カ所に裂傷を生み出す。融合中はゆっくりと動くが、レーザーを照射してもダメージは与えられない。耐久力が高いため、融合確認後に続けてレーザーを照射しつつ、端へ押し出しながらダメージを与えるといい。

【手順】

- 1 / レーザー ダメージを与える



すべてのケイルは、移動先にヒールゼリーを塗っておくと、移動速度が緩まるという特徴を持つ。



裂傷を生み出されたらすぐに結合。バイタルの数値も確認しながらケイルにレーザーを照射しよう。

ソーマ

使用器具



評価ポイント



コアが組織液に覆われているスティグマ。コアにレーザーを照射するのが目的だが、まずは組織液を吸引し、周辺に残組織をばら撒かせる必要がある。このときに、しばらくコアが出現するが、残組織を吸引してからコアを照射すること。残組織が悪化すると硬化組織になり、ソーマが生み出す腫瘍が悪化すると硬化腫瘍になる。それぞれ悪化させると除去の手順が増えるため、優先して処置しよう。

ソーマは2体同時に出現することもあり、その場合はコアの無い側を先に吸引すること。コア側を吸引してしまうと、コアが残組織をばら撒く際にもう1体も残組織をばら撒くため、対処が厄介になる。また、2体のソーマが出現したときに、コアのない側を識別して素早く吸引すれば、残組織をばら撒くまにに消滅させることができる。

【ソーマの手順】

- 1 / ドレイン 本体の組織を吸引
- 2 / レーザー コアにダメージを与える
- 1 / ドレイン 残組織を吸引
- 2 / レーザー 腫瘍を焼却

【硬化組織の手順】

- 1 / レーザー 硬化組織を焼却する
- 2 \ メス 硬化組織を剥離
- 3 / ピンセット 硬化組織をトレイへ運ぶ

【硬化腫瘍の手順】

- 1 / ドレイン 組織を吸引
- 2 \ メス 硬化腫瘍を剥離
- 3 / ピンセット 硬化腫瘍をトレイへ運ぶ



ソーマが光ると、その場所に腫瘍を生み出す。組織液の吸引を中断して腫瘍の処置を行なう。



硬化組織は組織にレーザーを照射してからメスで剥離。あとは回収トレイに乗れば処置完了。



硬化腫瘍はドレインで組織を吸引したあとにメスで剥離。最後に患部をトレイに乗せれば完了。



2体のソーマが出現したらまずコアを確認。識別できなかったら、腫瘍を生み出さない側を狙おう。

オープス

使用器具



評価ポイント



栄養源を吸収すると攻撃してくるスティグマ。コアは臓器の上をゆっくりと移動するだけだが、左右の大砲から小弾と大弾が発射されるので、それをコアに当たらないようにしつつ、コアにレーザーを照射して処置を行なう。固定タイプの地雷も発生し、コアに小弾、大弾が当たると、すべての地雷が爆発し、バイタルが大幅に減少する。コアにダメージを与えることよりも、弾と地雷の処置を優先しよう。

【手順】

- 1 / レーザー コアにダメージを与える
- 1 / ドレイン 小弾を吸引
- 1 / レーザー 大弾、地雷を焼却する



左右にうごめく砲台は攻撃不可能。オープスを消滅させるにはコアをレーザーで照射するしかない。



コアを照射し続けると、コアが2つに分裂。サイズは少し小さくなるが、大幅に難易度が高くなる。